



Curzate™ M 72WP

FUNGICIDA

**PARE EL TIZÓN
Y PROTEJA SU CULTIVO**

¿Qué es Curzate™ M 72 WP?

Es un fungicida con acción de contacto, protector, curativo enzimas y erradicante de esporas. Actúa sobre la producción de energía, inhibiendo la formación de enzimas y afecta la germinación de esporas, crecimiento micelial y formación de conidióforos, ocurriendo una acción "multi-sitio".

RECOMENDACIONES DE USO

Curzate™ M 72 WP está recomendado para uso en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Cultivo	Enfermedad que controla	Dosis	Frecuencia de aplicación
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Moho azul (<i>Peronospora tabacina</i>)	2 - 3 kg/ha (1,5 - 2 kg/mz)	3 a 5 días dependiendo de la incidencia del hongo y la humedad.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 - 3 kg/ha (1,5 - 2 kg/mz)	3 a 5 días
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)			
Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Mildiu lanoso (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2 - 3 kg/ha (1,5 - 2 kg/mz)	3 a 5 días
Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)			
Sandía (<i>Citrullus vulgaris</i>)			
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Mildiu lanoso (<i>Peronospora destructor</i>)	2 - 3 kg/ha (1,5 - 2 kg/mz)	3 a 5 días
Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)	Mildiu lanoso (<i>Bremia lactucae</i>)	2 - 3 kg/ha (1,5 - 2 kg/mz)	3 a 5 días

Para el control del moho de azul (*Peronospora tabacina*) se recomienda un programa preventivo con Curzate™ M 72 WP a la dosis de 250 gramos por 100 litros de agua. Utilice suficiente agua para obtener un completo cubrimiento de las plantas. Añada un agente humectante-adherente. Use como material de transplante únicamente plantas libres de enfermedad. Inicie las aplicaciones en el campo entre 7 a 10 días después del transplante o tan pronto como las plantas reinicien el crecimiento.

Tabaco tapado: Aplique a intervalos de 5 días.

Tabaco al sol: Aplique a intervalos de 3 a 5 días.

En condiciones severas de la enfermedad puede ser necesario acortar los intervalos de aplicación de 3 días tanto en el tabaco como al sol.

Dosis general: Aplique 40 gramos de producto por aspersora de 16 litros.

Costa Rica

Cultivo	Enfermedad que controla	Dosis
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	Dosis a utilizar: Para el control de las enfermedades citadas se utiliza una dosis de 1,25 - 2,5 kg/ha (0,9 - 1,75 kg/mz)

Intervalo y época de aplicación: Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y repetir cada 3-7 días.

Intervalo entre la última aplicación y la cosecha: 14 días.

Intervalo de reingreso al área tratada: Espere a que el rocío de la aplicación haya secado o en caso contrario utilizar equipo de protección personal.



Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá: Categoría Toxicológica IV / Precaución / Franja Verde
Rep. Dominicana: Categoría Toxicológica V / Precaución / Franja Verde
Teléfonos de Emergencia: **Guatemala:** (502) 2230-0807 - (502) 2232-0735 / **Belice:** (501) 223-1639 / **El Salvador:** (503) 2231-9262 / **Honduras:** (504) 2232-2322 / **Nicaragua:** (505) 2289-4700 ext. 1294 - (505) 8755-0983 / **Costa Rica:** (506) 2223-1028 / **Panamá:** (507) 523-4948 - (507) 523-4968 / **República Dominicana:** (809) 684-3478 / 3672 - (809) 681-7828.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

País	No. Registro
Guatemala	396-31
Belice	0112-23
El Salvador	396-31
Honduras	35-18-II
Nicaragua	El-330-6-99
Costa Rica	3582
Panamá	1276
Rep. Dominicana	3219