


Un SuperGanadero aumenta su productividad



Este producto no daña el pasto.
Es confiable para el ganado, siempre que siga las instrucciones de uso de acuerdo a la etiqueta.

Beneficios que ofrecemos

1. Asesoría técnica especializada
2. Las soluciones más avanzadas tecnológicamente
3. Capacitaciones continuas.



SuperPoderoso: no hay desafío al que no se le mida.

CombatranXT™ 22,5 ME

HERBICIDA

Formulación única y versátil con el mayor espectro de control.



Para Rep. Dom. Categoría Toxicológica: IV – Franja verde
Resto de países: Categoría Toxicológica: 5 – Franja verde
Teléfonos de emergencia: Panamá: (507) 523-4948 – (507) 523-4968 /
Honduras: (504) 2232-2322 / Guatemala: (502) 2230-0807 – (502) 2232-0735 / Nicaragua: (505) 2289-4700 ext.1294 – (505) 8755-0983 –
El Salvador: (503) 2231-9262.
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de las etiquetas antes de usar el producto.

PAIS

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Panamá
Rep. Dominicana

No. de Registro

479-134
AG2019101338
1126-568-I
DW-26A-2017
9273
5641



Visítanos en www.corteva.com

TM © Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva



CombatranXT™ 22,5 ME

HERBICIDA

CombatranXT™ 22,5 ME es el novedoso herbicida sistémico de amplio espectro, para el control de malezas de hoja ancha: herbáceas, semi-leñosas y leñosas, siendo selectivo al pasto. Su fórmula única y balanceada, lo hace un producto contundente que controla desde la raíz, las principales malezas que afectan la productividad de sus potreros. **CombatranXT™ 22,5 ME** pertenece a la familia Súper Ganadería™.

Recomendaciones de uso

País	Cultivo	Malezas	Dosis	Observaciones
El Salvador	Pastos	Guayabito <i>Psidium guajava</i>	4,5 L/ha (3,15 L/mz)	Utiliza un volumen de aplicación de 300 - 400 L/ha (210-280 L/mz). Realizar la aplicación cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo. Utilizar un coadyuvante no iónico. <i>Recomendación:</i> Ingrese el ganado al potrero antes de la aplicación para dejar expuesta la maleza, haga la aplicación del herbicida y por buenas prácticas de manejo del pasto, permita el descanso del potrero por 20 a 30 días para que el pasto cubra las áreas que quedarán libres de maleza.
		Aromo <i>Acacia farnesiana</i>	4 - 6 L/ha (2,8 - 4,2 L/mz)	
		Mimosa <i>Mimosa pigra</i>	1,5 L/ha (1,05 L/mz)	
		Caimito <i>Chrysophyllum mexicanum</i>	8 L/ha (5,6 L/mz)	
Nicaragua	Pastos Angleton, <i>Dichanthium aristatum</i>	Aromo <i>Acacia farnesiana</i>	4 - 6 L/ha (1 - 1,5 % v/v)	Utilizar un volumen de aplicación de 300 - 400 L/ha. Realizar la aplicación cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo. Utilizar un coadyuvante.
Guatemala Honduras Panamá	Pastos	Guayabito <i>Psidium guajava</i>	4,5 L/ha (1,5 % v/v)	Utilizar un volumen de aplicación de 300 - 400 L/ha. Realizar la aplicación cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo. Utilizar un coadyuvante iónico.
		Aromo <i>Acacia farnesiana</i>	4 - 6 L/ha (1 - 1,5 % v/v)	
		Mimosa <i>Mimosa pigra</i>	1,5 L/ha (0,5 % v/v)	
		Caimito <i>Chrysophyllum mexicanum</i>	8 L/ha (2 % v/v)	
Guatemala		Centavo <i>Desmodium spp.</i>	2.25 L/ha (0,75 % v/v)	La aplicación debe realizarse cuando la maleza esté en crecimiento continuo. Utilizar volumen de agua de 300 L/ha para garantizar una buena cobertura del foliole de la maleza.
Panamá		Escobilla <i>Sida spp.</i>	1.5 - 3 L/ha	Se recomienda realizar la aplicación cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo y preferiblemente antes de floración. Utilizar un volumen de aplicación de 300 - 400 L/ha.
República Dominicana	Pastos	Escobo <i>Sida spp.</i>	3 L/ha (1 % v/v)	Aplicar COMBATRANXT™ 22,5 ME cuando la maleza se encuentre en fase de desarrollo vegetativo y su nivel de infestación en el área a tratar lo amerite. Las aplicaciones se pueden realizar con bomba de espalda o equipo mecanizado (tractor). En ambos casos, el volumen de aplicación debe ser suficiente para lograr un mojado adecuado del foliole de la maleza, se recomienda un volumen de mezcla en la aplicación de 300 L/ha, esta debe realizarse sobre maleza expuesta. No se debe aplicar COMBATRANXT™ 22,5 ME sobre maleza que haya sufrido estrés por falta de humedad o por alguna otra causa. Se recomienda para obtener mejores resultados, el uso en la mezcla del adyuvante Kaytar Act 24 SL.
		Mori-vivi <i>Mimosa pudica</i> Bledo <i>Amaranthus spp.</i>	1.5 - 2.25 L/ha (0.5 - 0.75 % v/v)	
		Bejuco de nigua, <i>Tournefortia spp.</i> Doña ana, <i>Lantana camara</i> Bayahonda, Aromo, <i>Acacia spp.</i>	3 - 3.75 L/ha (1 - 1.25 % v/v)	
		Brusca, <i>Cassia uniflora</i> Anamú, <i>Petiveria alliacea</i> Berenjena cimarrona, <i>Solanum torvum</i>	2.25 - 3 L/ha (0.75 - 1 % v/v)	
		Guayabo, <i>Psidium guajava</i> Uña de gato, <i>Pisonia aculeata</i> Lino críollo, <i>Leucaena leucocephala</i>	4.5 L/ha (1.5 % v/v)	

Beneficios de usar CombatranXT™ 22,5 ME



- Facilidad en la elección del herbicida, gracias a su **amplio espectro de control**.
- Aprovechamiento de potreros invadidos por malezas de difícil control.
- Fórmula avanzada que permite mayor penetración y rapidez de control.
- Reducido impacto ambiental gracias a su composición.
- Ahorro en mano de obra, al reducir el uso de otros métodos para controlar malezas en sus potreros.
- Transforma potreros en ganadería rentable.

Principales malezas que controla CombatranXT™ 22,5 ME



Los 8 pasos del éxito de Súper Ganadería en la aplicación de CombatranXT™ 22,5 ME

- 1

Identificar la maleza más abundante en el potrero, consultar con el asesor técnico, en la guía de soluciones o con un distribuidor; para conocer cuál es la mejor solución para controlarla.
- 2

Adquirir el herbicida correspondiente y pastorear el potrero antes de aplicarlo. Permitiendo que la maleza quede expuesta.
- 3

Programar la aplicación cuando la maleza está creciendo vigorosamente. No aplicar si la planta está en floración, fructificación o sequía.
- 4

Utilizar el equipo de aplicación adecuado, ya sea para aplicaciones totales, en manchoneo o al tocón. Siempre usar el equipo de protección adecuado (guantes, overol, lentes de seguridad, mascarilla y botas).
- 5

Preparar correctamente la mezcla; usar la dosis recomendada para la maleza y el agua lo más limpia posible.
- 6

Asegurarse de aplicar sobre toda la maleza, mojando "a punto de goteo" todas las hojas.
- 7

Aplicar con buen clima, evitar hacerlo si se esperan lluvias próximas a la aplicación. Aplicar en las horas más frescas del día.
- 8

Dar el tiempo necesario para que el pasto se desarrolle y cubra el área que ocupó la maleza. Evitar sobrepastorear los potreros.