


# Un SuperGanadero aumenta su productividad



Este producto no daña el pasto. Es confiable para el ganado, siempre que siga las instrucciones de uso de acuerdo a la etiqueta.

## Beneficios que ofrecemos

1. Asesoría técnica especializada
2. Las soluciones más avanzadas tecnológicamente
3. Capacitaciones continuas.



# SuperProductivo: mantiene las malezas a raya.

## Terrano™ D 18,9 SL

**HERBICIDA**

Rápido y contundente. Mayor espectro en el control de malezas que las aminas.



Categoría Toxicológica: 5 - Franja Verde  
Teléfonos de Emergencia: **Guatemala:** (502) 2230-0807 - (502) 2232-0735 / **Belize:** (501) 223-1639 / **El Salvador:** (503) 2231-9262 / **Honduras:** (504) 2232-2322 / **Nicaragua:** (505) 2289-4700 ext. 1294 - (505) 8755-0983 / **Costa Rica:** (506) 2223-1028 / **Panamá:** (507) 523-4948- (507) 523-4968 / **República Dominicana:** (809) 684-3478 / 3672 - (809) 681-7828. Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

PAIS

Guatemala  
El Salvador  
Nicaragua  
Panamá  
Honduras

No. de Registro

479-130A  
AG2019071331  
DW-24W-2017  
9303  
993-435-1



Visítanos en [www.corteva.com](http://www.corteva.com)

TM © Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva



# Terrano™ D 18,9 SL

## HERBICIDA

Es un herbicida sistémico y selectivo a los pastos para el control de malezas herbáceas y semi-leñosas que invaden los potreros. **Terrano™ D 18,9 SL** pertenece a la familia Súper Ganadería™.

Antes



Después



## Recomendaciones de uso

País	Cultivo	Malezas	Dosis	Observaciones
Guatemala Honduras El Salvador Panamá	Pastos	Pegajosa o Jazmín de río <i>Cleome viscosa</i>	3 L/ha (2,1 L/mz) 1% v/v	En aplicaciones localizadas se debe alcanzar el punto de goteo en las malezas tratadas, mientras que en aplicaciones generalizadas el volumen de aplicación debe oscilar entre 300 y 400 litros de agua por hectárea. En ambos casos, el volumen empleado debe ser suficiente para lograr un mojado adecuado del follaje de la maleza.
		Frijolillo <i>Senna occidentalis</i>		
		Dormilona <i>Mimosa pudica</i>		
		Abejón o Quiebra platos <i>Senna obtusifolia</i>		
		Flor amarilla <i>Baltimora recta</i>		
Nicaragua	Pastos	Zarza cola de iguana <i>Mimosa albida</i>	2,25 - 3,0 L/ha (1,57 - 2,1 L/mz)	Las aplicaciones deben realizarse sobre malezas expuestas que se encuentren en estado de desarrollo vegetativo, antes de su floración.
		Flor amarilla <i>Baltimora recta</i>	3 - 5 L/ha (2,1 - 3,5 L/mz)	No se debe aplicar <b>Terrano™ D 18,9 SL</b> sobre maleza que se encuentra en estado de floración o cuando haya sufrido estrés (por falta de humedad o por alguna otra causa).
		Abejón <i>Cassia tora</i>		
		Dormilona <i>Mimosa spp.</i>		
Flor amarilla <i>Melampodium spp.</i>				

## Beneficios de usar Terrano™ D 18,9 SL



- Selectivo y confiable.
- Mejor control y más productividad.
- Rápido quemado y control de la maleza.
- Perfil toxicológico y ambiental más amigable.
- Mejor control de malezas que el 2,4-D.
- No daña el pasto, siempre y cuando se use según las recomendaciones en etiqueta.
- Excelente compatibilidad con otros herbicidas.

## Principales malezas que controla Terrano™ D 18,9 SL



## Los 8 pasos del éxito de Súper Ganadería en la aplicación de Terrano™ D 18,9 SL

- Identificar la maleza más abundante en el potrero, consultar con el asesor técnico, en la guía de soluciones o con un distribuidor; para conocer cuál es la mejor solución para controlarla.
- Adquirir el herbicida correspondiente y pastorear el potrero antes de aplicarlo. Permitiendo que la maleza quede expuesta.
- Programar la aplicación cuando la maleza está creciendo vigorosamente. No aplicar si la planta está en floración, fructificación o sequía.
- Utilizar el equipo de aplicación adecuado, ya sea para aplicaciones totales, en manchoneo o al tocón. Siempre usar el equipo de protección adecuado (guantes, overol, lentes de seguridad, mascarilla y botas).
- Preparar correctamente la mezcla; usar la dosis recomendada para la maleza y el agua lo más limpia posible.
- Asegurarse de aplicar sobre toda la maleza, mojando "a punto de goteo" todas las hojas.
- Aplicar con buen clima, evitar hacerlo si se esperan lluvias próximas a la aplicación. Aplicar en las horas más frescas del día.
- Dar el tiempo necesario para que el pasto se desarrolle y cubra el área que ocupó la maleza. Evitar sobrepastorear los potreros.